

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN ZONAS CON PICUDO ROJO

Primero

Revisar los ejemplares de forma continuada para detectar posibles síntomas.
(ver síntomas en Información Técnica)

Segundo

No podar el ejemplar durante los meses de abril a octubre, época de vuelo del insecto.

Tercero

Realizar periódicamente tratamientos químicos a los ejemplares sanos según calendario.
(5 tratamientos/año)

Cuarto

Si la palmera está ya afectada:

- ✦ Tratamiento inmediato con Clorpirifos 4,8% EC, repitiendo a los quince días.
- ✦ Después seguir calendario tratamientos.

Calendario tratamientos

abr-may	jun-jul	ago-sept	octubre	nov-dic
Clorpirifos 4,8% EC	Imidacloprid 20% SL	Clorpirifos 4,8% EC	Imidacloprid 20% SL	Clorpirifos 4,8% EC

*Clorpirifos 4,8% EC. (20 cc cada 10 litros de agua)

*Imidacloprid 20% SL. (7,5 cc cada 10 litros de agua)

Para más información:

Unidad de la Salud de los Bosques
Avda. Montañana, 930. 50059 Zaragoza
976 716 368 // 686 420 592
unidadsaludbosques@aragon.es